

DURACIÓN 3:30 horas

1. Para la resolución de la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{dy(x)}{dx} = f(y(x)),$$

se puede utilizar el método predictor-corrector ($P(EC)^n$).

- a) Escriba un método PEC con predictor un método de Euler explícito y como corrector una regla del trapecio

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(y_n),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(y_n) + f(\tilde{y}_{n+1})),$$

- b) Determine el término principal del error de truncado del método completo (predictor sustituido en el corrector)

$$\begin{aligned} y' - f(y) = TET &= \frac{f(y(x)) f'(y(x))^2}{6} - \frac{f(y(x))^2 f''(y(x))}{12} \\ &= \frac{y'(x) y''(x)^2}{6} - \frac{y'(x)^2 y^{(3)}(x)}{12}, \end{aligned}$$

- c) ¿Cuál es el orden de consistencia del corrector? ¿y del método completo?

2, segundo para los dos

- d) Determine el polinomio característico (o de estabilidad) para el método numérico completo.

$$p(r, h\lambda) = r - 1 - h\lambda - \frac{(h\lambda)^2}{2}$$

e) ¿Cuántas raíces espurias tiene este método numérico?

ninguna

f) Escriba el desarrollo de Taylor de la raíz principal hasta $O((h\lambda)^5)$

$$r = 1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2}$$

g) ¿Es fuertemente estable este método?

SI

h) ¿Es incondicionalmente, absolutamente estable este método? Si no lo es, determine su intervalo de estabilidad absoluta condicional

$$\text{NO,} \quad h\lambda \in [-2, 0]$$

i) ¿Es incondicionalmente, relativamente estable este método? Si no lo es, determine su intervalo de estabilidad relativa condicional

$$\text{SI,} \quad h\lambda \in (-\infty, \infty)$$

j) Considere un método *PECEC* (donde se aplica dos veces el corrector). Determine el término principal del error de truncado del método completo

$$\begin{aligned} y' - f(y) = TET &= \frac{-\left(f(y(x)) f'(y(x))^2\right)}{12} - \frac{f(y(x))^2 f''(y(x))}{12} \\ &= \frac{-\left(y'(x) y''(x)^2\right)}{12} - \frac{y'(x)^2 y^{(3)}(x)}{12}, \end{aligned}$$

k) ¿Cuál es el orden de consistencia del nuevo método completo?

2, segundo orden

l) Determine el polinomio característico (o de estabilidad) para el método numérico completo.

$$p(r, h\lambda) = r - 1 - h\lambda - \frac{(h\lambda)^2}{2} - \frac{(h\lambda)^3}{4}$$

- m) ¿Es incondicionalmente, absolutamente estable este nuevo método? Si no lo es, determine su intervalo de estabilidad absoluta condicional

$$\text{NO,} \quad h\lambda \in [-2, 0]$$

- n) ¿Es incondicionalmente, relativamente estable este nuevo método? Si no lo es, determine su intervalo de estabilidad relativa condicional

$$\text{SI,} \quad h\lambda \in (-\infty, \infty)$$

2. Vamos a aplicar el método de Elementos Finitos basado en polinomios lineales a trozos continuos, para resolver el problema

$$-(a(x) u'(x))' = f(x), \quad 0 < x < 1,$$

$$u'(0) = 1, \quad a(1) u'(1) + u(1) = 0,$$

donde $a(x) = 1 + x$ y $f(x) = \sin(x)$.

- a) Escriba una malla no uniforme para este problema
- b) Escriba la definición del espacio de polinomios lineales a trozos continuos $V_h^{(1)}$
- c) Escriba una base del espacio $V_h^{(1)}$
- d) Escriba el desarrollo de una función perteneciente a $V_h^{(1)}$

- e) Escriba la formulación de Galerkin continua de nuestro problema

- f) Escriba la formulación variacional continua de nuestro problema

- g) Escriba la formulación variacional discreta de nuestro problema

- h) Determine los coeficientes de la primera fila del sistema de ecuaciones lineales que obtiene

- i) Determine los coeficientes de la segunda fila del sistema de ecuaciones lineales que obtiene

- j) Determine los coeficientes de la última fila del sistema de ecuaciones lineales que obtiene