

C.E.S.Trinidad


Relación de Análisis

Matemáticas II

Ejercicio 2. Se sabe que las dos gráficas del dibujo corresponden a la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 e^x$ y a su función derivada f' .

(a) [1 punto] Indica, razonando la respuesta, cuál es la gráfica de f y cuál la de f' .

(b) [1'5 puntos] Calcula el área de la región sombreada.



Ejercicio 1. [2'5 puntos] Se sabe que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \alpha \sin x}{x^2}$$

es finito. Determina el valor de α y calcula el límite.

Ejercicio 2. Calcula

(a) [1'5 puntos] $\int \frac{5x^2 - x - 160}{x^2 - 25} dx.$

(b) [1 punto] $\int (2x - 3) \cdot \operatorname{tg}(x^2 - 3x) dx,$ siendo tg la función tangente.

Ejercicio 2. [2'5 puntos] Halla el área del recinto limitado por la gráfica de la función $f(x) = \operatorname{sen} x$ y las rectas tangentes a dicha gráfica en los puntos de abscisas $x = 0$ y $x = \pi$.

Ejercicio 2.- Sea $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \begin{cases} 1 + \alpha x & \text{si } x < 0 \\ e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

(a) [1 punto] Determina el valor de α sabiendo que f es derivable.

(b) [0'5 puntos] Haz un esbozo de la gráfica de f .

(c) [1 punto] Calcula $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

Ejercicio 1.- [2'5 puntos]

Se quiere construir un depósito en forma de prisma de base cuadrada sin tapadera que tenga una capacidad de $500\ m^3$. ¿Qué dimensiones ha de tener el depósito para que su superficie sea mínima?

Ejercicio 2.- [2'5 puntos] Determina la función $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f''(x) = \frac{1}{x}$ y su gráfica tiene tangente horizontal en el punto $P(1, 1)$.

Ejercicio 1.- Sea $f: [\frac{1}{e}, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - \ln(x) + a & \text{si } \frac{1}{e} \leq x \leq 2 \\ bx + 1 - \ln(2) & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

donde \ln denota la función logaritmo neperiano.

- (a) **[1'25 puntos]** Calcula los valores de a y b para que f sea derivable en el intervalo $(\frac{1}{e}, 4)$.
- (b) **[1'25 puntos]** Para $a = 0$ y $b = \frac{1}{2}$ halla los extremos absolutos de f (abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan).

Ejercicio 1.- Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones definidas por

$$f(x) = x^2 + ax + b \quad \text{y} \quad g(x) = c e^{-(x+1)}$$

Se sabe que las gráficas de f y g se cortan en el punto $(-1, 2)$ y tienen en ese punto la misma recta tangente.

- (a) [2 puntos] Calcula los valores de a , b y c .
- (b) [0'5 puntos] Halla la ecuación de dicha recta tangente.

Ejercicio 2.- Sea $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \ln(x + 1)$, donde \ln denota la función logaritmo neperiano.

- (a) **[0'75 puntos]** Esboza el recinto limitado por la gráfica de f , el eje OY y la recta $y = 1$. Calcula los puntos de corte de las gráficas.
- (b) **[1'75 puntos]** Halla el área del recinto anterior.

Ejercicio 1.- [2'5 puntos] Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como $f(x) = (x + 1)\sqrt[3]{3 - x}$. Halla las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = -5$ y en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio 2.- Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones definidas por $f(x) = x^2 - 2x + 3$ y $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$.

(a) [1 punto] Esboza las gráficas de f y g , y halla su punto de corte.

(b) [1'5 puntos] Calcula el área del recinto limitado por las gráficas de ambas funciones y el eje de ordenadas.

Ejercicio 2.- [2'5 puntos] Calcula el valor de $b > 0$, sabiendo que el área de la región comprendida entre la curva $y = \sqrt{x}$ y la recta $y = bx$ es de $\frac{4}{3}$ unidades cuadradas.

Ejercicio 1.- [2'5 puntos] En el primer cuadrante representamos un rectángulo de tal manera que tiene un vértice en el origen de coordenadas y el vértice opuesto en la parábola $y = -x^2 + 3$. Determina las dimensiones del rectángulo para que su área sea máxima.

Ejercicio 1.- Sea la función $f: [1, e] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 8 \ln(x)$ donde \ln denota la función logaritmo neperiano.

- (a) [0'75 puntos] Halla los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f .
- (b) [1 punto] Calcula los extremos absolutos y relativos de la función f (abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan).
- (c) [0'75 puntos] Estudia los intervalos de concavidad y de convexidad.

Ejercicio 2.- Sea f una función continua en el intervalo $[2, 3]$ y F una función primitiva de f tal que $F(2) = 1$ y $F(3) = 2$. Calcula:

- (a) [0'75 puntos] $\int_2^3 f(x) \, dx$ (b) [0'75 puntos] $\int_2^3 (5f(x) - 7) \, dx$
(c) [1 punto] $\int_2^3 (F(x))^2 f(x) \, dx$

Ejercicio 2.- [2'5 puntos] Calcula $\int_2^4 \frac{e^x}{1 + \sqrt{e^x}} dx$. *Sugerencia:* se puede hacer el cambio de variable $t = \sqrt{e^x}$.

Ejercicio 1.- [2'5 puntos] Un alambre de 10 metros de longitud se divide en dos trozos. Con uno de ellos se forma un triángulo equilátero y con el otro un cuadrado. Halla la longitud de dichos trozos para que la suma de las áreas sea mínima.

Ejercicio 2.- Considera el recinto limitado por las siguientes curvas

$$y = x^2, \quad y = 2 - x^2, \quad y = 4.$$

- a) [1 punto] Haz un esbozo del recinto y calcula los puntos de corte de las curvas.
- b) [1'5 puntos] Calcula el área del recinto.

Ejercicio 1.- Considera la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 e^{-x^2}$

- a) [0'75 puntos] Estudia y determina las asíntotas de la gráfica de f .
- b) [1'25 puntos] Halla los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos relativos (abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan).
- c) [0'5 puntos] Esboza la gráfica de f .