

LOS DOS PARCIALES

Métodos Matemáticos y Técn. Comp.

Nombre del Alumno:

DNI:

NO SE PERMITEN NI APUNTES, NI FORMULARIOS, NI CALCULADORA

DURACIÓN: 3:30 horas

PUNTUACIÓN:

1. Tenemos que suministrar electricidad a cuatro grandes ciudades (A, B, C, y D) a partir de tres centrales distintas (1, 2 y 3). Cada ciudad tiene una demanda de potencia eléctrica (DEM en MKw/h) y cada central una potencia máxima suministrable (SUM en MKw/h). El coste del transporte de esta electricidad entre las centrales y las ciudades es

	A	B	C	D	SUM
1	8	6	10	9	35
2	9	12	13	7	50
3	14	9	16	5	40
DEM	45	20	30	30	125

- a) Si queremos minimizar el coste del suministro de la electricidad, qué variables de decisión tenemos que tomar:

x_{ij} = MKw/h que suministra la central i a la ciudad j ,

$i \in \{1, 2, 3\}$, $j \in \{A, B, C, D\}$, Hay 12 variables

- b) ¿Cuál es la función objetivo a minimizar?

- c) Escriba las restricciones de suministro (note que el problema está equilibrado)

- d) Escriba las restricciones de demanda (note que el problema está equilibrado)

- e) Escriba otras restricciones que sean necesarias (si las hubiera)

- f) Si quisiera resolver este problema mediante el método SIMPLEX, escriba la forma estándar de este problema (Max, $A = b$ y $x \geq 0$) minimizando el número de restricciones y variables de holgura x_{hi} (aproveche que el problema esta equilibrado):

- g) Crees que este problema tiene solución única.

2. Determina los puntos óptimos de la función

$$x + x^2 + 3xz - z^2 + \sin^2(y).$$

- a) Determine todos sus puntos críticos.
- b) Para el punto crítico de menor $|y|$.
- 1) Evalúe el determinante de la matriz hessiana.
 - 2) Tienen todos los autovalores de la matriz hessiana el mismo signo (¿cuál es?).
 - 3) Es un máximo, mínimo o punto de silla.

3. Para la ecuación parabólica auto-adjunta

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(a(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = t = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t), \quad u(x, 0) = u_0(x),$$

podemos usar un método de Crank-Nicolson aplicado a la semi-discretización (sólo espacial) auto-adjunta

$$\frac{du_j(t)}{dt} = \frac{1}{\Delta x^2} \delta_x(a_i \delta_x) u_j(t),$$

donde δ_x es el operador en diferencias $E^{1/2} - E^{-1/2}$, y $Eu_j = u_{j+1}$.

- a) Detalla la expresión del método de Crank-Nicolson semi-discreto.
- b) Desarrolla los operadores en diferencias y detalla la ecuación en diferencias parciales resultante del método.
- c) Cuál es el orden de consistencia de este método.
- d) Detalla sus términos del error de truncado.
- e) Detalla un tratamiento para las condiciones iniciales que tenga el mismo orden de consistencia que el método.
- f) Detalla un tratamiento para las condiciones contorno que tenga el mismo orden de consistencia que el método.
- g) Suponiendo $a(x)$ constante, aplica el método de von Neumann para el análisis de la estabilidad del método.
- h) ¿Podrías estudiar la estabilidad del método completo incluyendo condiciones de contorno utilizando el método de von Neumann?

¿SI o NO?

- i) Detalla la aplicación del método de Newton para la resolución de las ecuaciones del método de Crank-Nicolson completamente discreto.